



Patienteninformation **“Verhalten nach Prostata-Stanzbiopsie“**

Sehr geehrter Patient!

Bei Ihnen wurde gerade eine Gewebeentnahme aus der Prostata durch den Enddarm durchgeführt.

Aufgrund dieses Eingriffs könnte es in den nächsten 2-3 Tagen zu leichten Blutungen aus dem After (Blutauflagerungen auf dem Stuhl) bzw. zu Blutbeimengungen in Urin oder Ejakulat kommen.

Um Komplikationen zu vermeiden, ist es wichtig, dass Sie einige Verhaltensregeln beachten:

- Nehmen Sie am Abend des Untersuchungstages die zweite Dosis des verordneten Antibiotikums
- Trinken Sie nach dem Eingriff reichlich (ca. 2-3 Liter).
- Patienten, die aufgrund anderer Erkrankungen (z. B. Herz, Niere) nur bestimmte Mengen an Flüssigkeit zu sich nehmen dürfen, sollten dies in einem Gespräch mit dem Arzt klären.
- Messen Sie in den ersten 3 Tagen nach der Biopsie 2 x tgl. Ihre Temperatur, bei auftretendem Fieber (über 38°) oder Schüttelfrost stellen Sie sich bitte sofort bei Ihrem Urologen bzw. in der Ambulanz unserer Klinik vor.

Ebenso sollten Sie in folgenden Fällen den Urologen bzw. unsere Ambulanz aufsuchen:

- bei ausgeprägten Blutungen mit z. T. häufigen, blutigen Durchfällen
- bei einer inkompletten Blasenentleerung (Gefühl einer ständig gefüllten Blase bei minimaler Entleerung)

Ihr Team der Klinik für Urologie